

tens rätt bör behålla namnet *f. ruderale* Hn. Mindre utpräglade äro exemplar från Vg. Mösseberg (C. M. NYMAN 1871), Uppsala (FR. AHLBERG 1880), Dalarne Sätters socken (M. ERIKSSON 1883) och Solvarbo (E. BOMAN 1883). Hos dessa äro bladen något tillspetsade och största bredden ligger närmare basen. De bilda därför öfvergång till följande form.

I C. SÄVES Synopsis Floræ Gothlandicæ 1837 nämnes en ny lokal för den bredbladiga *C. arvense* »in prato prope S:t Görans Kapell extra Wisby non parce». Det är emellertid ej riktigt samma form som föregående. De i SÄVES herbarium förvarade exemplaren äro rikt håriga och något bredbladigare än hos hufvudarten; skillnaden är dock ej stor. Att bättre differentierade individ funnos på platsen, synes af ett i WESTÖÖS herbarium befintligt exemplar (Fig. 1), som insamlats 1842 på den af SÄVE uppgifna fyndorten. Det är en tämligen markerad form med ovanligt tät och lång hårighet å blad och stjälk samt vid basen breda och mot spetsen långsamt afsmalnande blad; ett af de öfre bladen är t. ex. 5 mm. bredt och 14 mm. långt. Bladen (de öfre eller mellersta) äro sålunda äggrundt lansettlika. Samma form har på samma plats insamlats 1861 (af C. F. NYMAN), 1871 (PH. TRYBOM) och slutligen 1910 (TH. LANGE). Liknande former finnas från Slite (C. REUTERMAN 1850) samt Hälsingland, Ljusdal (K. F. DUSÉN 1879).

I NEUMANS och AHLFVENGRENS flora beskrifves under namnet *var. gotlandicum* Ahlfv. en form, som skiljer sig från hufvudformen genom »bredt lansettlika—nästan äggrunda blad». Jag tror ej, att jag tar miste, då jag antar, att denna benämning hufvudsakligen afser formen från S:t Göran och andra liknande. I alla händelser passar beskrifningen in på dem. Hvad hårigheten beträffar, är *C. arvense* mycket varierande; men i regel synas de bredbladigare formerna ha rikare indument än öfriga. En form, som nära nog sammanfaller med föregående, men synes vara ännu bredbladigare, är *f. latifolium* Fenzl (i Ledeb., Flora Rossica). Hos den skulle de öfre bladen vara äggrunda och 5—9 mm. breda.

Det finnes sålunda i Sverige två bredbladiga, genom mellanformer i hvarandra öfvergående former af *Cerastium arvense* L.

K. Johansson.

En ny värdväxt för *Lathræa squamaria* L. Vid ett besök i Älfkarleö den 23 maj i år fann jag ett totalt exemplar af *Lathræa squamaria* L. växande på rötterna af *Tilia ulmifolia* (L.) Scop. Då WITTROCK i sin uppräknig af *Lathræa squamarias* värdväxter i Svensk Bot. Tidskr. 1909, p. 17 ej omnämner lindan, har jag ansett mig böra lämna ett meddelande om detta fynd.

K. V. Ossian Dahlgren.

***Botrychium virginianum* (L.) Sw. i Västmanland.** Enligt meddelande af häradshöfving K. BERGENSTRÄHLE anträffades af honom år 1903 ofvanstående växt i ungefär 6 exemplar vid Sala grufva.

K. V. Ossian Dahlgren.

Svensk Botanisk Tidskrift
Band 4 1910