

Euphrasia suecica Murb. & Wettst. Snöstorp vid Marbäck; Knäred vid Majenfors.

E. stricta Host. Flerstädes i provinsen.

Antirrhinum orontium L. Nya Skottorp (Stud. HUGO HALBERG).

Verbascum phlomoides L., Halmstad vid bron och på västra stranden 1909.

Psyllium arenarium W. & Kit., Öfraby vid Sperlingsholm 1904 (i sågspån).

Plantago aristata Mich., Falkenberg å en äng på västra gärdet 1897—99 (S. S.).

Galium corrudifolium Vill., Falkenberg vid valskvarnen 1909 (S. S.).

Phyteuma spicatum L., Falkenberg, hamnen 1894 (S. S.).

Xanthium strumarium L. och *X. spinosum* L., Halmstad på Väster 1906 ymnigt.

Crepis virens L., Ö. Karup (K. J.).

Lappa nemorosa (Lej.) Koern. Ö. Karup vid Gropemöllan i Stensåns dalgång.

Cirsium oleraceum (L.) Scop. v. *amarantinum* Lang. Ö. Karup vid Gropemöllan.

C. oleraceum (L.) Scop. $\times$ *palustre* (L.) Scop. Ö. Karups prästgård (K. J.); Hasslöfs by vid kyrkan.

Centaurea calcitrapa L. Halmstad vid Slottsmöllan 1909.

C. solstitialis L., Halmstad på Västra gärdet 1906.

Senecio vernalis W. & K. Halmstad norr om Berget 1904; Falkenberg vid Herting och Kristineslätt spars. (S. S.) samt söderut efter järnvägen mot Skrea.

Rudbeckia hirta L., Halmstad i Badhusparken 1909; Hishult (K. J.).

Halmstad den 4 december 1909.

Fr. E. Ahlqvengen.

Galium triflorum Michx. i Västmanland.

Då *Galium triflorum* Michx. mig veterligt hittills icke blifvit anmärkt från Västmanland, torde ett meddelande om att den förekommer äfven inom nämnda provins måhända vara af intresse.

Sommaren 1906 fann jag ifrågavarande växt nära Gryttjärn i Järnboås socken, ungefär tre fjärdedels mil från Järnboås järnvägsstation. Den växer här på ett litet område uteder västra stranden af en i nordlig riktning flytande skogsbäck. Strandslutningen är delvis tämligen brant och skuggig samt här och där beströdd med löst liggande stenar. Jordarten utgöres — enligt den geologiska kartan — af krosssensgrus, här beväxt med barrskog samt enstaka löfträd. Höjden öfver hafvet uppgår till cirka 140 meter. På denna lokal tycktes *Galium triflorum* trivas godt; ett af mig insamladt exemplar hade något öfver 75 cm. lång stjälk med mer än 4 cm. långa och 1 cm. breda blad.

På något afstånd från bäcken, där marken är mera jämn samt ej så beskuggad, fann jag ingen *Galium triflorum*; icke heller kunde jag finna den på motsatta sidan af bäcken.

Axel Binning.